

ZOLVIS 80 micro

**COMPOSIZIONE:**

ZOLFO g. 80
Coformulanti q.b. a g. 100

FORMULAZIONE:

Polvere bagnabile micronizzata

CONFEZIONI:

1 kg - 10 kg - 25 kg

COLORAZIONE:

Beige

CLASSIFICAZIONE:

Xi - irritante

MISCIBILITA':

ZOLVIS 80 è compatibile con tutti i prodotti esclusi quelli a reazione alcalina, olii minerali, diclofluanide e captano.

TEMPO DI CARENZA:

5 gg.

REGISTRAZIONE:

n. 4292 del 01.04.1981

**Fungicida a base di zolfo bagnabile
micronizzato per il controllo dell'oidio.**

Lo ZOLVIS 80 è un fungicida specifico per il controllo in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura e in numerose altre colture agrarie ed ornamentali, dell'oidio, della ticchiolatura, dell'escoriosi, lebbra e moniliosi.

Lo ZOLVIS 80, grazie alla sua formulazione assicura una copertura uniforme della vegetazione, con conseguente elevata azione preventiva, eradicante e curativa della malattia a partire da 10°C. Nella speciale formulazione in microgranuli evita la fastidiosa polverosità tipica dei preparati tradizionali in polvere pur mantenendo una perfetta solubilità in acqua.



manica[®]

ZOLVIS 80 micro

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO



VITE: contro Oidio 200-400 g./hl iniziare i trattamenti molto presto (germogli 5-10 cm), proseguire poi in abbinamento con i prodotti antiperonosporici (Poltiglia Bordoiese Industriale Manica). Nelle situazioni di forte pressione della malattia, per ottenere una più persistente durata d'azione ed un'azione eradicante e curativa, impiegare la dose di 600 g./hl.



POMACEE (MELO, PERO): contro l'Oidio e ticchiolatura del melo 600 g./hl nei trattamenti pre-fiorali; 200-400 g./hl nei trattamenti post-fiorali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).



DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO: contro Oidio 200-600 g./hl. Su albicocco, pesco e nettarine usare la dose più alta in pre-fioritura e dopo la raccolta, alla dose di 200-400 g./hl dopo la fioritura ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).



FRAGOLA: contro Oidio 200-500 g./hl.



NOCCIOLO: contro Oidio ed Eriofide 200-500 g./hl.



ORTAGGI: contro Oidio 200-500 g./hl. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia e ripetere ad intervalli di 7-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).

PISELLO: contro Oidio 200 g./hl; **POMODORO:** contro Oidio 200-400 g./hl; **MELONE:** contro Oidio 300-350 g./hl; **COCOMERO, CETRIOLO, ZUCCA:** contro Oidio 200-300 g./hl.



BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Oidio 8 Kg/ha dalla comparsa della malattia e proseguire con cadenza di circa 20 giorni.

CEREALI: 8 Kg/ha. Trattare alla comparsa della malattia dalla "levata" alla "spigatura".



FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro Oidio 200-500 g./hl, intervenire alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Al fine di rispettare la sensibilità varietale nei confronti dello zolfo si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, specie durante il periodo estivo.



Prodotto ammesso in agricoltura biologica in base alla direttiva CE 2092/91 e successive modifiche.

* vedi nota in indice.